

误服疏通剂 肿成“香肠嘴”

□本报记者 张鸿鹏
通讯员 黄丽纹

还记得电影《东成西就》里欧阳锋为了偷《真经》，误吞毒药，变成“香肠嘴”的一幕吗？前不久，这一幕在泉州市妇幼保健院儿童医院里出现。



《东成西就》里的香肠嘴

18日中午，阳阳和6岁的姐姐在家中玩耍。

前两天阳阳奶奶网购马桶疏通器，附赠了一包管道疏通剂，快递寄来后，就被随手放在门后。中午，姐姐无意间拆开快递，看到疏通剂觉得好奇，就用圆珠笔扎破外包装袋，放在厨房灶台上。

“阳阳看到包装里面装着白色固体颗粒，以为是白糖，就抓起一把放进嘴里。”阳阳的父亲陶先生回忆。

这种固体颗粒含氢氧化钠，强碱性，具有强腐蚀性，接

触到口腔唾液后产生化学反应，阳阳瞬间感到刺痛，哭喊起来。

奶奶看包装上写着可以用大量清水冲洗，抱起阳阳到水槽边，用清水为阳阳冲洗口腔并催吐，殊不知这给阳阳造成了更严重的灼伤。

陶先生开车回家，马上将他送到泉州市儿童医院救治。

接受胃镜检查后，确诊阳阳口腔严重溃疡，红肿化脓，已经不能开合，只能保持张开一个横指的大小，发不出声音，更别提喝水进食了。

接诊的泉州市儿童医院消化内科主治医师邹素娟介绍，阳阳食道浅表有灼伤，庆幸没有伤及胃部；由于不能正常进食，只能先插鼻胃管进牛奶等流食，至少还需要住院观察一周。

提醒

误服强酸强碱可用干布擦拭并喝牛奶

在泉州市儿童医院，日常门诊中，误服强酸、强碱烧伤，误吞纽扣电池烧伤的病例不少，误服洁厕剂、消毒剂、磁力球、硬币等情况也时有发生。

当孩子误服强酸强碱性物



品，要如何处理呢？

邹医生说，如果遇到孩子误服强酸、强碱等有腐蚀性的液体时，切记不要给孩子催吐，不要对着患处冲水，家长应用干布或纸巾擦拭掉误服物品，并给孩子喝大量的牛奶或鸡蛋清，保护消化道黏膜，减少酸碱的腐蚀及吸收。

误服毒副作用较大的药物时，例如降压药、镇静药，家长发现时要及时催吐，比如刺激孩子咽部，呕吐排出药物，并尽快送去医院。当孩子出现抽搐、昏迷时不要催吐，以免发生窒息。在做好以上紧急处理方式后，一定要尽快带孩子到医院救治。

□本报记者 廖小勇
通讯员 陈芳

周末，5岁的蕊蕊（化名）在妈妈的陪伴下来到工地，给正在工作的爸爸送餐。其间，蕊蕊一个人在工地的空地上玩耍，蕊蕊把工地上的一根近30厘米长的钢筋当成武器，耍弄了起来。岂料，工地上突然传来了“啪”的一声，钢筋击伤了蕊蕊的左眼，当下流血不止。

这根钢筋戳断了蕊蕊的左眼泪小管，导致蕊蕊流泪不止。

爸爸妈妈抱着流泪不止的她，从漳州来到厦门眼科中心，寻求医生的帮助。

在厦门眼科中心副主任医师江国华的巧手施救下，蕊蕊断裂的泪小管终于成功吻合，蕊蕊受伤的眼睑也得以缝合。

提醒，3~8岁是孩子发生意外伤害的高峰年龄段，此阶段的儿童对周围事物好奇心强、辨别能力差，活动能力逐渐增强，活动范围逐渐扩大，意外伤害多发。仅近段时间来，厦门眼科中心就接诊了不少眼外伤患儿，有尺子击伤眼睛的，也有睫毛插入眼球的等等。家长应加倍看护好孩子，做好儿童安全教育，让孩子远离尖锐物品。而遇紧急事件也一定要注意方法，如果有异物插入孩子的眼睛，家长切忌自行拔出异物，这样有可能对眼睛造成二次伤害，加重病情，应该在第一时间将孩子送医治疗。

工地『耍』钢筋 击伤左眼血泪流

胸腔居然变成『盘丝洞』

反复『长水』五年

□本报记者 邓剑云
通讯员 李小花

3月份开始，50多岁的福州人老王出现了咳嗽、活动后气促症状，且越来越重，他怀疑是旧疾复发。

5年前，他因为用力呼吸时右侧胸部隐隐作痛就医。检查后，医生告诉他有胸腔积液，给他做了置管引流。胸水没了，胸痛缓解后出院。可这5年里，这类症状反复出现。

是不是胸腔又“长水”了？

在福州市第一医院，CT提示，其右侧胸部有大量包裹性胸腔积液。5年来反复胸腔积液，没有根治，最主要的原因就是没有确诊。

要找到病根需要借助胸腔检查技术。

呼吸与危重症医学科一科科长徐礼裕感到意外的是，因为反复胸腔“长水”，老王的胸腔仿佛变成了“盘丝洞”，操作就像闯迷宫，好不容易找到可以下手的地方，取得了活检组织标本。

经病理分析，明确老王反复胸腔积液的罪魁祸首是，结核菌感染了胸膜（结核性胸膜炎）。

精准的治疗后，老王的情况不断变好。

鼻腔反复出血 癌症误认鼻炎

□本报记者 张师
通讯员 陈灵滨

“一开始不当回事，后面吓得腿软，这心情真的是跟坐过山车一样。”

宁德62岁的老王，平时身体素质还不错，鼻子堵、耳鸣、鼻涕……这些症状来临时，以为是鼻炎，随意买点药对付，稍有缓解，即忘了有此事发生。

半年前，出现右侧鼻腔反复出血。

4月中旬，老王前往宁德师范学院附属宁德市医院耳鼻喉科就诊。

接诊后，耳鼻喉科副主任医师徐杨斌为老王做了电子鼻咽喉镜检查，发现右侧鼻腔内肿物生长，出血主要来源于肿物，不排除鼻咽癌复发可能。医生询问得知，老王在18年前查出鼻咽癌，经历了放化疗。

医生推断，老王鼻腔内的肿物生长是由鼻咽癌放化疗后体质变差、骨质坏死等原因引起。因此，建议他入院治疗。

经过一个多小时的手术，成功将老王右鼻内如“鸽子蛋”一般大的肿物切除干净。



据了解，鼻腔颅底区域解剖关系复杂，是近年来外科手术中最富挑战力的新兴领域之一。此次，宁德市医院耳鼻喉科在山东省耳鼻喉医院“王海波名医工作室”专家团队助力之下，完成了该院首例经鼻内镜下鼻腔鼻窦肿物侵犯颅底的微创等离子切除手术。目前，这项技术达到省内先进水平。

链接

鼻咽癌的“蛛丝马迹”

相对于其他常见的癌症，鼻咽癌早期治愈率很高，但到了晚期就很难治。

鼻咽癌早期就很容易误诊，人们常把鼻咽癌和鼻炎这些疾病混淆起来。

宁德市医院耳鼻喉科副主任医师徐杨斌指出，如果出现以下几种临床症状，最好多留心，及时到医院耳鼻喉科或肿瘤科就诊，排除患鼻咽癌的可能：

长期鼻塞 因肿瘤生长堵塞鼻腔及后鼻孔引起，一开始多是一侧鼻塞，随病情发展，瘤体变大，可能出现双侧鼻塞。

回吸性涕中带血 早期鼻咽癌，患者可在鼻咽分泌物中发现带有血丝或者小血块，或出现鼻涕带血，但因出血量不多，很容易被忽视。

偏头痛 这种情况多是因为癌细胞侵犯颅底、神经和血管等引起，疼痛特点为单侧持续性头痛，其中以额部、颞部、顶部和枕部疼痛较多。

耳鸣与听力减退 肿瘤压迫咽鼓管咽口，使鼓室形成负压，在鼓室及乳突气房内形成积液引起，这种感觉就有点像洗澡时鼻腔进水，或者坐飞机快速下降时的耳朵闷胀感。

颈部淋巴结肿大 如果脖子短时间无缘无故出现快速增长且坚硬的肿块，无压痛，不易被推动，也要和鼻咽癌联系到一起。