

抢救八旬老人 解了20多年难题

□本报记者 廖小勇
通讯员 夏华珍

“整个人都不好”

孙老太太今年82岁,不久前她突然生病了:气喘、呼吸急促又深大,精神状态极差。家人赶紧把她送到厦门市海沧医院就诊。

原以为是肺部出问题,一检查,却发现老人“整个人都不好”,尤其是肾功能衰竭,出现急性加重,已经是尿毒症!

脱垂的子宫感染,肾脏“停摆”,患者还继发一系列情况,厦门市海沧医院肾内科主任丁新国博士立即组织抢救。两周后,老人的病情总算平稳下来。

可“病根”——子宫脱垂没能处理好,对老人始终是个威胁。

解除多年“大患”

自从老人出现子宫脱垂以来,家人曾带着她到数家大医院



就诊,但要么建议自己塞回去,注意清洁,或让使用托具,要么就因为年龄大、病情重、老人身体状态差等诸多原因,不主张手术治疗。

一次次碰壁后,他们渐渐灰心,只能接受现实。

让他们没想到的是,丁主任和她的治疗团队积极联合医院专家会诊、讨论,希望能为老人进行子宫切除手术,解决老人多年“大患”。

听起来很简单,实施起来却非常困难。

老人年事已高,手术,有可能无法下手术台。

医院经过精心准备,3月31日,老人被送入手术室。在复合麻醉下,由泌尿外科李超主任医师进行手术,排查清泌尿道的情况,并解除梗阻;此后由妇产科主任医师龚江红主刀完成经阴道子宫、双附件切除加阴道封闭术。这场手术前后牵动数个科室近20位专家、专科医务人员,历时4个多小时,圆满完成。困扰老人近20年的子宫脱垂问题,终于解决了。

手术后,老人一度出现阵发性室上速、低血压等危险,又转回到肾内科继续治疗,非常可喜的是,解除梗阻后,老人的肾功能恢复了一部分,目前已经脱离透析。

□本报记者 张帅

通讯员 缪卡莉 谢焰锋

我国已经成为世界第三大隆胸大国,每年假体隆胸手术量已达10万例,隆胸手术已是整形大潮里的排头兵。

前些日子,在重塑女性的曲线美10多年以后,柘荣39岁的袁女士发现自己乳房两侧不对称,而且出现变形,左乳有肿物、包块等情况。

由于袁女士是在私立医院整形科做了“硅凝胶假体隆乳术”,接诊医生无法同时完成假体植入整形手术和乳腺肿瘤术。因此,袁女士前往闽东医院乳腺外科就诊。

在全身麻醉的状态下,闽东医院乳腺外科李成贻主任医师为袁女士行“左乳肿瘤切除+双侧胸大肌后假体隆乳术”。术中,通过超声引导精准定位,选择隐蔽小切口,切除袁女士体内的两个肿瘤,随后取出原有挛缩变形的假体,放置硅凝胶假体,术后乳房外观疤痕小。

李成贻提醒,虽说假体隆胸手术能让女性乳房“一夕之间”变大,但也要注意其潜在风险,选择正规医疗机构进行以提高手术安全性,术后也要做好护理。

■链接

包膜挛缩是常见问题

在正常的隆胸愈合过程中,在乳房植入物周围形成一个包膜或组织衬里。通常,该衬里是柔性的。一小部分患者,该包膜在植入物周围变硬并收缩,这称为包膜挛缩。发生这种情况时,乳房的外观和感觉会不自然。在严重的包膜挛缩症状中,乳房可能会变得疼痛、肿胀、有硬块,可能呈现球形外观。

呼吸康复介入 让高龄重症患者顺利脱机

□本报记者 廖小勇

通讯员 石青青 彭丽红

重症患者长期戴呼吸机,会遇到的脱机困难的问题,不仅造成医疗费用显著增加,而且患者生活质量明显下降。据了解,厦

门大学附属中山医院开展的呼吸康复介入治疗帮助众多危重患者成功脱机。

前不久,厦门大学附属中山医院呼吸与危重症医学科收治了一位84岁阿婆,病情危重,左主于心

肌梗死支架植入术后,肺水肿、脓毒血症并重症肺炎,需持续血透超滤,有创机械通气20余天脱机困难,经过RICU重症监护团队的精心个体化治疗,入院第三天,即成功拔管脱机,患者转危为安。

宁德完成首例脑干出血微创穿刺手术

□本报记者 张帅 通讯员 徐伟

高血压性脑干出血起病急促,进展迅速,病情危重,致死率极高。

近日,一位突发神志不清3小时的47岁男子,从卫生院被紧急转送至福鼎市医院急诊科。来院时,患者已经神志昏迷。

头颅CT检查提示:重症脑干出血,唯有手术才有一线希望。

神经外科主任邓德旺立即组织科内讨论,最后决定采用C型臂X光机引导下立方体定向脑干出血微创穿刺引流术,尽全力

抢救患者。

当日,在邓德旺主任的指导下,由徐伟副主任医师主刀,对患者进行急诊抢救手术。手术前通过仔细测量患者颅脑CT扫描所提供的脑干出血三维立体定位参数确定穿刺点及穿刺路径,在C臂X光机透视引导下,进针至预定深度,抽吸出约5毫升暗红色淤血,随后摆放引流装置,透视确认定位精准,穿刺过程非常顺利。

患者术中生命体征平稳,这台挑战生命禁区的手术成功完成。

术后第3天,复查血肿已基



本清除,予拔除引流管。术后1周,患者神志完全转清楚,与医生握手表示感谢救了他一命(图)。

记者获悉,这是福鼎市医院结合基层医院实际情况,采用C型臂X光机引导,完成了宁德市第一例脑干出血微创穿刺手术。

“纯天然”染发剂,导致过敏的人不少

□本报记者 陈坤

染发导致过敏,病人不少

近日,62岁的福州张老伯发现自己头发白了不少,于是请女儿网购了一款“纯天然染发剂”,在家染发。染完后,当天晚上,头面部出现红斑、水疱、肿胀、渗出,伴随剧烈瘙痒。被紧急送入福州市皮肤病防治院皮肤科就诊。

接诊医生、福州市皮肤病院过敏性皮肤病亚专科副主任医师翁立强立即处理,张老伯的皮疹逐渐消退,一周后痊愈。

“平均每周都会接诊1~2例因

为染发导致过敏的病人。青年女性和老年人各占一半。”翁立强说,这些病人往往听信报纸、网络上宣传的染发产品,导致皮肤过敏。

据了解,目前市售染发剂多为持久性氧化型染发剂。

氧化型染料中的对苯二胺是极强的致敏剂,为染发皮炎最常见的过敏原。此外,氧化型染发剂中还含有调色剂(主要为酚类)、氧化剂(如过氧化氢、过硼酸钠等)、辅加剂等多种成分,也可发生过敏反应。

“最严重的情况就是患处水

肿、破溃渗出,伴剧烈瘙痒等。”翁立强医生说。另外,累及面颈部的严重染发皮炎,经治疗皮疹消退后,会遗留暂时性的色素沉着,影响美观。

染发前,做“斑贴试验”

若有条件,可带上染发剂,到正规医院皮肤科做斑贴试验。

也可以取少量染发剂涂抹在耳后或手肘内侧,并用透气胶布贴上48~72小时,若测试期间皮肤出现红肿、烧灼感等情况,代表自己对这种染发剂过敏,应避免使用。

染发前不建议洗头,可以在发际、耳朵等部位涂保湿剂(凡士林、乳液或面霜)以保护皮肤不受伤害。染发后要立即清洗头发,最好达三次,确保染发剂产品未残留,并使用护发素、发膜等护发产品,修护受损发质。

这几类人不建议染发

接触苯二胺等成分可能存在导致胎儿畸形的风险,因此孕妇、哺乳期女性不建议染发。

头皮皮肤破损者,血液病患者,荨麻疹、特应性皮炎、哮喘等过敏性疾病患者等最好不染。