

耳朵自动播放交响乐,这种怪病还不少 神秘声音让老人烦躁

□本报记者 林颖
通讯员 吴阿玲

明明周围没人播放音乐,可耳朵里从早到晚都自动循环着音乐声,最近,这种奇怪的感觉让85岁的陈奶奶茶饭不思、心情烦躁。这神秘的音乐声究竟缘起何处?

或与听力下降有关

据陈奶奶描述,自己耳朵里经常“播放”的是各种交响乐,音调时高时低,节奏时快时慢。而且还有个规律,如果晚上睡不好,次日白天耳朵听到的音乐音量比较大,相反,睡得好,音乐声就变

小了。

为了弄清原因,陈奶奶来到福建省级机关医院神经内科就诊。医生安排陈奶奶进行了神经影像学、神经电生理、前庭功能评估等检查。神经内科季晓林主任医师、严金柱主任医师、耳鼻喉科蔡艳绯副主任医师、精神心理科莫夸耀副主任医师也多次对陈奶奶进行诊疗,考虑陈奶奶除了存在双耳老年性聋、感音神经性聋、焦虑抑郁状态外,还存在一种非精神性幻听疾病——音乐耳综合征。

陈奶奶在通过口服抗焦虑抑

郁、改善睡眠质量等药物治疗3周后,她的焦虑、抑郁情绪、睡眠质量及食欲均得到了改善,耳朵里的音乐声也明显变小。

出院后,医生建议陈奶奶佩戴合适的助听器,并鼓励她平日可以丰富周围声音环境,这样,她的耳朵就不会总被幻听过多占用了。

有些人群,此病多发

陈奶奶出现的这种幻听并不是个例,在老年人群及有听力损失、长期缺少听觉刺激、耳鸣,且焦虑或(和)抑郁的人群中比较多见。之所以这样的幻听,可能是听觉系统和大脑因听力下降而产

生的一种声音感知。此外,成人听力障碍患者在植入人工耳蜗后也可能出现此病。通常他们听到的音乐是简单旋律的片段,且多是患者经常听的或是年轻时听的音乐,如流行音乐、管弦乐或广播音乐等。

别给患者太多心理压力

音乐耳综合征的疾病在听力损害的人群中占据了10%~30%,但患者往往担心自己被视为“疯子”而隐瞒了这个小秘密。

所以,一旦发现家人出现了音乐综合征,严金柱建议家属应当给予他们充分的心理安慰,千万不要把他们当成精神病患者,以减轻他们的心理压力。如果患者还伴随着焦虑、抑郁,就应当给予抗焦虑、抑郁药物治疗。此外,可以尽早选配合适的助听器来改善听力。

闽东医院:重建血流向 做好颅手术

□通讯员 顾翔

近日,闽东医院神经外科在省级医院专家指导下成功为一名颅内动脉瘤患者实施密网支架Tu-bridge血流重建治疗微小破裂脑动脉瘤手术。

患者是32岁小伙阮先生,突发头痛求诊于闽东

医院神经外科,经脑血管造影检查发现左侧脑内一微小动脉瘤破裂。医疗团队决定使用密网支架Tu-bridge血流重建治疗动脉瘤。为保证手术成功施行,邀请省级医院专家莅临指导。术后10天患者康复出院。

神经外科主任医师陈水钰介绍,密网支架又被称为血流导向装置,它可以重建血管,通过改变进入动脉瘤的血流方向从而达到彻底、持久的动脉瘤栓塞效果,完全避免了传统手术方法损伤大、出血多等问题。

食管瘤遇到大溃疡 血管外科医生勇闯“禁区”

□本报记者 邓剑云
通讯员 魏映双

当食管肿瘤切除手术遇上主动脉弓部巨大溃疡,任谁看了都明白,这是十分棘手的事。

然而,在患者以为手术还没开始时,“排雷”手术已经完成了,危险信号解除。

5月初,78岁的泉州大叔因吞咽困难,到当地医院检查,查出食管肿瘤。随后,他转诊到福建省人民医院胸外科,医生建议

手术治疗。

术前检查时发现,他的主动脉弓部有一巨大的溃疡,在食管手术的过程中,极有可能出现破裂大出血。

主动脉弓部病变以往被视为血管外科医生的“禁区”。

福建省人民医院血管外科主任夏印接到会诊请求后,立即组织全科讨论,

考虑到患者高龄,合并高血压等多种基础疾病,全麻做主动脉弓置换的开放手术“九死一生”,最终决定,采用主动脉弓部巨大溃疡微创腔内隔绝+锁骨下动脉开窗支架植入的方式,完整覆盖病变。

夏印主任介绍,随着医学科学的进步及医疗器械的创新,主动脉弓部病变已逐渐被攻克,采取微创腔内治疗不仅创伤小(无切口)、恢复快,更能达到确切的治疗效果。



孕妇脐带脱垂,宝宝命悬一线 分秒必争,十分钟救回婴儿

发现:“不好,脐带脱垂!胎儿的胎心也在下降,需要立即分娩。”

一场抢救母婴生命的战斗立刻打响。

方龙凤立即跪在检查床上,用力推先露部分,减少脐带受压,其他医护人员协助抬高小英的臀部,采取臀高头低位,将产妇推进了手术室准备剖宫产。与此同时,罗天华、谢吉凤主治医师紧急行剖宫产,儿科王燕主任医师也到手术室做新生儿复苏准备。所有抢救药品、物品、设备、人员全

部迅速到位。各环节的衔接没有丝毫犹豫和半刻停顿。

“哇!”随着宝宝一声响亮的啼哭,他们取得了抢救的最终胜利,在场医护人员如释重负。

从发现脐带脱垂到宝宝出生,仅仅十分钟,有个旁观者一脸蒙圈说道:“这是发生了什么,感觉还没开始已然结束……”

厦门医学院附属第二医院产科主任颜涛玲表示,脐带脱垂是产科的急症之一,因此产科每年都多次开展相

□本报记者 刘伟芳
通讯员 黎斌 黄雪娟 林慧华

家住漳州龙文区的黄先生,在市区一推拿馆按摩保健时,突然出现头晕、口角僵硬、说话含糊不清,以及左侧肢体麻木、乏力。在稍作休息仍没好转的情况下选择就医,被诊断是患上了脑中风。

针对这起病例,第909医院神经内科主任卢武生提醒,推拿、按摩的保健方式应谨慎选择,尤其是老年人或者肥胖、患有高血压糖尿病的人群,大多有颈动脉斑块,一旦按摩不当容易造成斑块脱落,进而随着血流进入颅内堵塞脑血管,引发脑中风。

此外,美国心脏协会(AHA)和美国卒中协会(ASA)也曾经关于颈部推拿与卒中风风险联合发出声明,因为在中青年卒中里,8%~25%的中青年卒中为颈动脉夹

层所致,而这与颈部推拿关系密切。

除了推拿外,特殊的头位:长时间低头、咳嗽、擤鼻涕、颈部按摩,或从事某些体育活动,如举重,打羽毛球、高尔夫球、网球及做瑜伽,还有紧急刹车时头部惯性前倾等,都可能导致动脉夹层,导致脑中风。

所幸经过解放军联勤保障部队第909医院神经内科的医务人员为期6天的精心治疗,黄先生于6月1日上午得以从重症病房转入普通病房。

■链接

若出现口角歪斜,一侧肢体麻木、乏力,或讲话言语不清,一定要立即到具有开通堵塞血管能力和资质的综合(高级)卒中中心急救治疗,且溶栓必须在发病4.5小时内,血管内取栓在6小时内,否则预后不佳,将留下诸多后遗症,甚至导致脑死亡。

关的应急演练。一旦发生,拼的就是全科室人员对预案应急的积极响应以及多学科之间的紧密合作。

■链接

一些调皮的宝宝,占10%~15%,在出生前会出现胎位不正的现象。最危险的“姿势”就是脐带先露啦,因为它极易引发严重的并发症——脐带脱垂!

所谓脐带先露就是胎儿脐带绕在了头先露部位的前面或旁边,也就是先露的脐带直接跑进了阴道内,甚至露在了阴道的外面。



□记者 廖小勇 通讯员 林凌

6月8日早上,孕妇小英(化名)突然感觉下体有大量液体流出,下腹也持续阵痛。小宝宝要“抢闸”降生了,家人急忙把她送到厦门医学院附属第二医院产科。接诊的方龙凤医师紧急检查