

男孩“丁丁”太小可能是病

□本报记者 林颖

家有宝宝的父母对婴幼儿及儿童的身高、体重尺度表肯定不陌生。每隔一段时间,家长都会量一下孩子的身高体重,看看他们的生长发育有没有落后于“别人家的孩子”。

但有一个东西,家长们明面上不好意思比拟,只能私底下暗中观察,那便是男孩子的“丁丁”(阴茎)。假如比尺度值低太多,家长就要引起重视了。

“小鸡鸡”躲猫猫 一查问题不小

前不久,8个月大的小迪(化名)的父母非常焦虑,因为小迪的“丁丁”埋在肉堆里,看上去非常小,小到几乎看不见了,这可愁坏了父母。

1个月前,父母带着小迪来到省儿童医院泌尿外科周朝明主任医师的诊室,周朝明给小迪做了检查,发现他的“丁丁”牵拉后长度仅1.5cm,诊断为小“丁丁”,合并重度隐匿性“丁丁”。

周朝明给小迪做了“整形”手术,将躲猫猫的“丁丁”给拉了出来,恢复了正常外观,排尿也自然多了。

男宝成长过程中 家长记得留意“丁丁”长度

“丁丁”多短,才算是小“丁丁”呢?

通常是指“丁丁”牵拉长度小于相同年龄人,或者正常性发育状态人群的“丁丁”长度平均值2.5标准差者。

年龄分组	阴茎牵拉长度在不同年龄人群分布	
	平均值±标准差 (cm)	平均值-2.5 标准差 (cm)
新生儿	3.5±0.4	2.5
0-5 月	3.9±0.8	1.9
6-12 月	4.3±0.8	2.3
1-2 岁	4.7±0.8	2.6
2-3 岁	5.1±0.9	2.9
3-4 岁	5.5±0.9	3.3
4-5 岁	5.7±0.9	3.5
5-6 岁	6.0±0.9	3.8
6-7 岁	6.1±0.9	3.9
7-8 岁	6.2±1.0	3.7
8-9 岁	6.3±1.0	3.8
9-10 岁	6.3±1.0	3.8
11-12 岁	6.4±1.1	3.7
成年人	13.3±1.6	9.3

由于“丁丁”患者常常会合并隐睾,还可以表现为尿道下裂、嗅觉异常、生长发育异常等。如不及时治疗,可能影响小孩的“丁丁”生长发育,可能会遗留心理阴影,因此,周朝明建议家长,如果发现家中男孩“丁丁”短小,应早诊断、早治疗。

小“丁丁”大都和基因突变密切相关,主要治疗方案有外用、口服或肌注性激素治疗,小“丁丁”治疗仪治疗,如果上述保守治疗疗效欠佳,手术治疗是最终的选择。

隐匿性“丁丁” 小胖墩更常见

相比小“丁丁”,隐匿性“丁丁”是一种越来越常见的疾病,它和小“丁丁”都表现为外观短小,常与包茎、蹼状“丁丁”、性发育异常等疾病相混淆,如不仔细诊断及鉴别诊断,容易错过黄金治疗时期,耽误小孩的生长发育时机。

隐匿性“丁丁”是一种发育正常而显露异常的疾病。父母可以自己检查下孩子,牵拉“丁丁”头后放开,观察“丁丁”回缩情况。如果在牵拉时“丁丁”可以伸出包皮外,但很快就回缩进去,就可能是隐匿性“丁丁”,要赶紧找专科医生咨询。

“如果是肥胖原因引起的,减肥是很重要的治疗手段。但若肥胖患儿减肥效果不佳,或本身是先天性隐匿性“丁丁”,则需考虑手术治疗。”周朝明说。

玩游戏,502胶水粘住眼睛

□本报记者 张帅

通讯员 张世杰

居家生活,便宜又好用的502胶水粘贴迅速、牢固,购买方便,是大部分家庭常备的日用品。

暑假,有孩子中招。

福州长乐6岁男孩小聪(化名)在家与小伙伴玩耍时,突然大喊大叫。在厨房做饭的妈妈闻声跑出来,见到小聪双眼紧闭,脸颊憋得通红,十分痛苦。

经过询问得知,孩子们正在玩角色扮演游戏,一名孩子扮演“医生”,拿着502胶水玩闹,把胶水当眼药水用,滴在了小聪的眼

睛上,双眼被紧紧粘住,睁不开。

小聪被火速送往东南眼科医院进行处理。

东南眼科医院正在急诊值班的贺琴主治医师接诊后,发现小聪的睫毛和睑缘皮肤上均有胶水粘着。她先用剪刀将粘着的睫毛剪掉,再用棉签清理残留的胶水,逐步将上下眼皮分开,最后用生理盐水为小聪充分冲洗双眼。

“有角膜上皮小片状剥脱,但受损不严重,对视力影响不大。”接诊医师为小聪开了眼药水后,嘱咐他回家观察,按时来院复查。

502胶水进入眼睛如何处理?

东南眼科医院角膜病科黄可进主治医师介绍,如果502胶水不慎滴入眼中,眼睛不仅会被快速凝固的胶水封住,还会受到有毒物质的刺激,造成结膜充血甚至损伤眼角膜。

发生此类化学药剂进入眼睛的情况,要尽量保持冷静,先用清水冲洗眼睛10分钟,然后迅速到眼科医院请医生进行处理。由于502凝固后会结块,就医过程中尽量不要转动眼球,防止眼睛被凝固的胶水划伤。

这些伤眼的“凶器”

1.餐具

2.文具等

笔、圆规、三角板、尺子、温度计、502胶水等等。

铅笔最危险,因为铅笔芯戳进眼睛后容易折断,笔芯滞留在眼睛里,处理起来非常麻烦。

3.石块等硬物

石头块、桌角等。硬物击伤虽然不容易引发眼内的感染,但可能出现外伤性白内障、外伤性青光眼、视网膜剥离等眼疾,也会造成失明。

4.干燥剂

干燥剂的主要成分是氧化钙,吸水后变成氢氧化钙,会释放大量的热量,使空气急剧膨胀发生爆炸。

5.日常化学制剂

洁厕灵、84消毒液、洗衣粉等强酸、强碱之类的化学物品进入眼中,又缺乏相关必要的自救知识和能力,即使第一时间送医,眼球也会遭到严重

烧伤。

自救方法:立即用大量清水冲洗眼睛10~15分钟,冲洗时应把眼皮撑开,然后尽快送往附近的医院治疗。

6.塑料硬质吸管

有的边走边喝水,一不小心,塑料吸管戳伤眼睛、戳伤嘴的情形时有发生。

7.电子产品

手机、iPad、电视等电子产品,长时间使用电子产品很容易引起眼睛近视、散光等。

□本报记者 张帅

福安7岁的晓晓(化名)反复咳嗽、气喘发热长达一个月。早先家长以为是风寒感冒,在社区诊所也按“感冒”消炎治疗。

随着患儿症状逐渐加重,精神状况越来越差,呼吸越来越急促,声音也变得嘶哑,家长担心起病因。

6月11日,家长带着晓晓来到宁德市闽东医院耳鼻喉头颈外科寻求治疗。

经肺部CT检查发现,晓晓的右侧支气管闭塞,伴右侧中下肺叶不张,医生考虑支气管内有异物的可能,为晓晓做气管异物取出手术。

当天,陈缪安主任团队利用小儿气管镜,于术中顺利取出异物,发现是一个7厘米的橡皮。随着异物被完整取出,晓晓的呼吸变得通畅平稳。

“儿童误吞异物,在我们科室的日常门诊中,每年遇到10余例。”闽东医院耳鼻喉头颈外科刘俊平主治医师说。小儿呼吸道异物是很危险的急症,一旦怀疑儿童吞咽了异物,千万不要喂食馒头、米饭、醋等,以免异物进一步下滑而卡得更深,甚至威胁生命。

如何预防误吞异物情况发生

1.饮食注意

最好不要给5岁以下儿童吃果冻、瓜子、花生、豆类等食物。吃西瓜时可先去掉瓜籽。进食避免谈笑、哭闹或打骂小儿。要改掉边走边玩边进食的不良习惯,以免一旦跌交后啼哭,将口中食物吸入下呼吸道。

2.教育儿童不要把小玩具放在口中

发现儿童口中含有东西时要及时设法取出。但切不可强行夺取,以免哭闹后吸入。

3.工作习惯

成年人应改掉工作时把针、钉等物咬在嘴里的习惯,以防发生意外。对于昏迷或全麻后未清醒的病人,要细心护理:预先取下已摇动的假牙,呕吐时,头应转向一侧,以免呕吐物吸入下呼吸道。

4.对于老年人及某些疾病特别是脑血管病患者

饮水及进食时应特别注意,最好采取坐位或半卧位,切忌着急喂食,避免大口进食及饮水。

若在院外发生气道异物“卡壳”,甚至气道被完全堵塞时,完全被异物堵塞住气道或喉咙的情况十分危急,根本来不及送医院,因此必须进行院外抢救,其中急救方法是否正确得当至关重要。

误吞橡皮擦 幼童反复咳嗽气喘

链接