

福建医科大学附属第一医院

# “私处”突然隆起 原是罕见的会阴疝

68岁的谢阿姨一年前接受了一场直肠癌根治手术。9个多月前,她发现自己会阴部的切口处出现一个圆形“包块”,约鸡蛋大小,站立或者长时间行走的时候很明显,躺着又变小了。这奇怪的“包块”让谢阿姨很困惑,而且越长越大,渐渐从“鸡蛋”长成了“火龙果”,站立时腹部坠胀特别明显,严重影响了日常活动。

饱受折磨的谢阿姨,慕名找到福建医科大学附属第一医院副院长,肝胆胰疝外科学科带头人

翁山耕教授。翁山耕教授判断,谢阿姨长的“包块”其实是一种罕见的腹外疝——会阴疝,需要手术治疗。

谢阿姨腹腔粘连严重,腹壁缺损巨大,并且做过直肠癌手术,盆底无强健肌肉组织,因此修补起来十分困难。

翁山耕教授团队为患者行“后盆底重建术+会阴疝无张力修补术”,术后第二天,谢阿姨就开始下床活动,她对切口的疼痛评分为0(即自感无痛),起床、行走

等轻体力活动时也仅有一点胀胀的感觉,很快便出院了。

此例复杂会阴疝的成功开展,标志着该院肝胆胰疝外科在疝和腹壁外科治疗复杂疑难疝方面达到了一个较高的水平。

**什么是会阴疝?**

会阴疝最初的表现是会阴处鼓起,逐渐成为一个明显的包块,包块在站立、行走或增加腹内压(搬重物、咳嗽、用力排便)时出现或增大,并且会逐渐增大,部分病

人出现局部钝痛、坠胀感、饱胀感、便秘等不适症状。

**会阴疝的治疗**

会阴疝临床极为少见,常误诊为大阴唇囊肿(巴氏腺囊肿)、坐骨结节囊肿、坐骨疝、寒性脓肿、血肿、脂肪瘤等。

目前,手术修补是会阴疝唯一有效的治疗方法。

(福建医科大学附属第一医院肝胆胰外科、疝外科 周冰冰 吴晓莉)

厦门市妇幼保健院

## 女婴突发罕见栓塞,命悬一线

□本报记者 廖小勇  
通讯员 林媛 陈锋

9月24日,孕31周的曾女士来到厦门市妇幼保健院产科特需门诊进行常规产检。当值的B超医生练敏发现异常,职业素养告诉她这个胎儿可能出现了罕见的脐动脉栓塞。

何晓琴副主任医师第一时间用三维彩超再次详细查看,她高度怀疑脐动脉栓塞,而且结合各项指标判断,胎儿已经出现宫内缺氧状态,必须



马上住院。

科室即刻启动应急预案,杨华主任当机立断安排紧急手术,新生儿科医护人员做好抢

救准备……

心电监护的滴滴声让手术室显得异常安静,台下每个人都替这个小生命捏了一把汗,随着手术刀精准划动,一名健康的女婴被轻轻取出!

此时,产妇子宫腔几乎干涸没有羊水,靠近胎儿段十几厘米长的脐带呈紫黑色麻花状扭曲!再晚几个小时,结局不堪设想。

在医护人员的精心呵护下,宝宝体重从出生时的1100g,已经增至1800g。

宁德市医院

## 反复头痛一年 切除巨大脑瘤

□本报记者 张 帅  
通 讯 员 陈灵滨

**入院抢救**

46岁的王女士,一年前开始出现反复头痛,近期头痛发作频次及程度均有加重。王女士在宁德的医院做了CT检查,结果显示左侧额顶部占位,计划转省级医院做进一步治疗,但在等待转院过程中,王女士出现意识不清及中枢性呼吸衰

竭,于是紧急转入宁德师范学院附属宁德市医院救治。

宁德市医院神经外科主任医师蔡智基立即组织科室医疗团队进行积极抢救,并制定手术方案。在全科医护人员共同努力下,王女士入院15分钟便进行了手术。

经过长达7小时的紧张手术,王女士的肿瘤终于被完全切除,经查无神经功能缺损,现已痊愈出院。



### 什么是脑膜瘤

蔡智基主任表示,脑膜瘤是一类颅内原发性肿瘤,90%的脑膜瘤属于良性肿瘤,只要术中能够切除干净,一般不会复发。一般来说,脑膜瘤生长缓慢,大多数肿瘤早期症状不明显,直到脑组织受压,颅内压力增加到一定程度才有头痛等症状。

### 如何预防脑膜瘤

脑膜瘤绝大多数属于良性肿瘤,生长慢,病程长。因肿瘤呈膨胀性生长,病人往往以头痛和癫痫为首发症状。根据肿瘤位置不同,还可以出现视力、视野、嗅觉或

听觉障碍及肢体运动障碍等。在老年人,尤以癫痫发作为首发症状多见。颅压增高症状多不明显,尤其在高龄病人。在CT检查日益普及的情况下,许多患者仅有

轻微头痛,甚至经CT扫描偶然发现为脑膜瘤。

因此,如果出现头晕、头痛、肢体乏力、抽搐等症状时,最好及时到医院就诊,以便尽早发现病变。

福建省级机关医院

## 用力搬花盆 搬出眼出血

□本报记者 林颖

近日,福建省级机关医院眼科门诊就接到了三例这样的患者。

最先来看诊的患者林奶奶今年69岁,她右眼红了一大片,很是吓人。

林奶奶有15年的高血压病史,她心中一阵恐慌,难道是血管破了,要中风了?

接诊的林泰南副主任医生检查发现,老人的双眼视力都是0.6,并且右眼并没有看到明显的充血,只是结膜下有一大片出血。

林泰南问林奶奶是否有提重物或搬重物,还没有等林奶奶回答,她老伴就抢先答道:“有有有,这两天把家里的花盆搬来搬去,我想帮忙都不肯。”

听了二人的讲述后,林泰南告诉林奶奶,她眼结膜出血的原因就是因为用力搬花盆导致的。

### 链接>>>

眼结膜下有丰富的小血管,如果因为外伤或眼部手术导致结膜小血管破裂,就会出现出血症状。

“但日常更为常见的是自发性出血。”林泰南说,“一般会出现自发出血的大多与高血压病、动脉硬化、血管弹性降低、脆性增加有关。当这类患者猛然用力、剧烈咳嗽、大便干燥或轻微揉碰眼睛时,都有可能引发眼部小血管的破裂出血。”

因此,出现结膜出血,应视为一种提示信号,提示血管可能变脆或硬化,需要加强定期血压监测,其他如糖尿病或心血管疾病患者也易引发,需加以留意。