



出生仅两小时“熊猫血”宝宝患溶血性黄疸 泉州医护生死接力救他一命

儿溶血性黄疸。

新生儿科医护团队会诊后,决定立即为小东进行外周动静脉同步换血术,再次予换血治疗,但经两次换血后效果欠佳,胆红素依然居高不下。

小东生命危在旦夕,该院新生儿科学科带头人陈冬梅立即召集团队医生,集体会诊,在征得家属同意情况下,为小东实施血浆置换。

所谓的血浆置换是将患者的血液引出体外,经过膜式血浆分离方法将患者的血浆从全血中分离出来弃去,然后补充等量的新鲜冷冻血浆或人血白蛋白等置换液,这样便可以清除患者体内的各种代谢毒素和致病因子,从而达到治疗目的。

经过两次历时4小时的紧张“血浆置换”治疗,37天夜以继日的守护,小东顺利出院。

据悉,新生儿血浆置换技术在国内外开展不多,本次新生儿血浆置换技术的成功开展,为新生儿血液净化治疗又打开了一条全新的通路,为更多患儿带来了福音。

陈冬梅表示,该院新生儿科目前已开展5例血浆置换手术,本次属首例将血浆置换技术应用

于新生儿溶血性黄疸。同时,标志着医院对危重症新生儿的救治技术已经达到国内先进水平。

据了解,新生儿溶血病是由于母婴血型不合引起的胎儿或新生儿同族免疫性溶血性疾病,临床以胎儿水肿和(或)黄疸、贫血为主要表现,严重者可致死或遗留严重后遗症。

陈冬梅表示,新生儿溶血症防大于治,抵御新生儿溶血症的威胁,建议做好以下几点:

首先要重视准妈妈的产前检查,特别是血型检测。此外,如果是Rh阴性血或ABO血型不合溶血病的孕妇,预防新生儿溶血症可以考虑使用相关的药物,具体的使用方法要在医生的建议下选择使用。

建议有血型不合危险因素的女性(如Rh阴性血或O型血)在孕检的时候,尤其要重视抗体滴度的检查,这样便于随时掌握胎儿的情况。

如果是存在高风险新生儿溶血症倾向的孕妇,应在具有新生儿抢救能力条件的医院分娩,并在生产时做好相应的准备。随着医学的进步,治疗新生儿溶血症也不是难事。(张鸿鹏 黄丽纹)

小贴士

母婴血型不合的情况有以下两种:

1.ABO血型不合

母亲O型,父亲A型、B型或者AB型,那么胎儿与母亲相同时,没事。如果胎儿跟父亲相同则母体可能产生对抗胎儿血细胞的抗体,并经过胎盘进入胎儿体内,一起胎儿红细胞破坏,产生溶血。有可能第一胎就病发,而且这种情况会随着妊娠次数的增加而加重病情,不过也不是所有O型血母亲都会发生此病,这取决于母亲体内的抗体量。

2.Rh血型不合

如果母亲是Rh阴性,胎儿是Rh阳性,那么带有Rh阳性抗原的红细胞会通过胎盘进入母体血液,产生相应的血型抗体,此抗体又经过胎盘进入胎儿血液循环,作用于红细胞,导致溶血,一般第一胎出现这种情况的较少,多次妊娠的妇女则容易引起溶血。

在中国ABO型溶血症相对较为常见。

突然变懒和火锅有关

□本报记者 刘伟芳
通讯员 夏雨晴

4个月前,赖先生常常感到腰疼难耐,不仅如此,髋关节、膝关节、踝关节、腕关节、肩关节等也出现了间断性疼痛。

一向勤劳的赖先生,最近患上了“懒汉病”。

不久后,赖先生就开始持续发热,他来到国家区域医疗中心复旦大学附属华山医院福建医院感染科门诊就诊。

感染科的副主任医师胡越凯、副主任医师赵旭怀疑他可能是感染了布鲁菌病。随后进行的布鲁菌相关检测结果,证实了医生的判断。经过治疗,赖先生的症状有了明显改善。

布鲁菌病又称马尔他热,是由布鲁菌属细菌引起的人、畜共患的传染性疾

病。其临床特点为长期发热、多汗、关节痛及肝、脾肿大等。

目前已知有60多种家畜、家禽,野生动物是布鲁菌的宿主。与人类有关的传染源主要是羊、牛、猪、犬、鹿、马等。

医生提醒,圈养牛羊、生喝牛羊奶、涮火锅时牛羊肉没烫熟、烧烤时牛羊肉未烤熟烤透等,都存在感染布鲁菌病的风险。

我国布鲁菌病主要集中在北方地区,但近些年南方地区有增长的趋势,部分感染患者有圈养羊或喝羊奶经历。因此养羊、喝羊奶需谨慎。

冬天爱吃火锅的你,怕了吗?



医师茶座

□本报记者 张鸿鹏
通讯员 徐志斌

生活当中,长期饮酒导致许多疾病出现,酒精性股骨头坏死的发病率越来越高,给患者的生活和工作带来了极大的困扰。近日,泉州市中医院骨二科副主任医师苏昭元便收治了71岁、有40年“酒瘾”的张大爷。

张大爷年轻时就很爱喝酒,可谓无酒不欢,家里及周围的亲朋好友都知道他爱喝酒,每每都会叫他过去畅饮,而且他不会控制,常常喝得酩酊大醉。长此以往,张大爷也形成了顿顿喝酒的生活习惯,且每天“一斤白酒”的海量。

十年前,张大爷开始感觉


酒瘾害死双侧股骨头

双髋关节经常酸痛,自己并不重视,继续顿顿喝白酒,双髋部的疼痛也越来越严重,就在入院前4天,张大爷终于疼痛难忍,无法站立行走。

在家人的督促下,他就诊于泉州市中医院骨二科门诊,经过苏昭元主任全面问诊与检查,诊断为“双侧股骨头无菌性坏死”,建议张大爷行手术治疗。

苏昭元主任带领科室团队讨论完病情后,认为张大爷双侧股骨头坏死已经到了后期,保守治疗及保髋治疗已经不再适用于该患者,但考虑到张大爷年龄大,最终确定为张大爷进行“右侧人工全髋关节置换术”。

苏昭元解释:这是因为长期大量饮酒而造成酒精在体内蓄积,导致血管痉挛,从而影响了股骨头的血供,此外,长期的饮酒也会导致脂代谢紊乱,引起股骨



头内循环障碍而致骨内高压,导致髋部出现疼痛,同时随着病情的不断发展将会导致股骨头坏死。

该如何避免出现“股骨头坏死”?

对于有长期饮酒史的人群来说,要养成定期体检的习惯,来检查和发现潜在的疾病,及时进行生活习惯的调整或者尽早治疗。

“及时止损”。一旦确诊早期股骨头坏死,应该尽快采取专业的治疗,随着医学技术的进步,如果治疗及时,及时恢复股骨头的血运,经过专业的保髋治疗,就能够保住股骨头。

提醒大家的是,控制饮酒,小酌怡情,多喝伤身,为了您身体健康,少喝为宜,不喝最好。

