

厦门社区连夜发放抗原检测试剂盒 市民居家进行抗原检测



3月11日晚,厦门市根据外省协查函,对在厦1名密切接触者进行排查,核酸检测结果为阳性,即转运至定点医院诊治,诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。该确诊病例在厦门市活动轨迹涉及厦门火车站、地铁以及海沧区。

厦门迅速行动,海沧区的居民接连收到社区送达的抗原检测试剂盒,并首次进行居家自助检测。按规定自测,在25分钟后上传结果。

核酸检测依然是新冠病毒感染的确诊依据,抗原检测作为补充手段可以用于特定人群的筛查,有利于提高早发现能力。(福建卫生报综合 中国新闻网、微博网友)



在核酸检测基础上 增加抗原检测

为进一步优化新冠病毒检测策略,根据疫情防控需要,国务院联防联控机制综合组研究印发了《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》,推进“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式,在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充。

《方案》规定了抗原检测的适用人群:

一是到基层医疗卫生机构就诊,伴有呼吸道、发热等症状且出现症状5天以内的人员;

二是隔离观察人员,包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员;

三是有抗原自我检测需求的社区居民。

需要说明的是,核酸检测依然

是新冠病毒感染的确诊依据,抗原检测作为补充手段可以用于特定人群的筛查,有利于提高“早发现”能力。基层医疗卫生机构具有核酸检测能力的,应当首选核酸检测;不具备核酸检测能力的,可以进行抗原检测,并做好医务人员的培训和患者的沟通指导。隔离观察人员和社区居民进行抗原检测,应当认真阅读说明书、规范操作,一旦抗原检测阳性要立即向有关部门报告;必要时,进行核酸检测予以确认。

(国家卫健委)



5款新冠抗原自测产品上市

3月12日,国家药监局发布通告,批准南京诺唯赞、北京金沃夫、深圳华大因源、广州万孚生物、北京华科泰生物的新冠抗原产品自测应

用申请变更。

自此五款新冠抗原自测产品正式上市。

(央视新闻)

“抗原检测”是啥?
上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏医生介绍,抗原检测一般用于急性感染期,即疑似人群出现症状7天之内的样本检测。疑似人群抗原阳性及阴性结果均应当进行进一步的核酸检测,阳性结果可用于对疑似人群的早期分流和快速管理,但不能作为新冠病毒感染的确诊依据。社区居民有自我检测需求的,可通过零售药店、网络销售平台等渠道,自行购买抗原检测试剂进行自测。选用的抗原检测试剂须经过国家药品监督管理部门批准。

抗原检测和核酸检测有何不同?
杭州迪安生物技术有限公司总经理董伟斌介绍,新冠抗原检测主要是检测病毒的一些特异性蛋白,来确定检测者是否被感染;而核酸检测主要是检测新冠病毒的核酸基因片段。两者检测的是不同的物质。

检测准确率哪个更高?

董伟斌介绍,核酸检测比较准确,出错概率很少,而且在感染早期也能发现。抗原检测更适用于初筛的情况,而且如果是在感染的头一两天,抗原检测还不一定能测出来,需要在感染一定时间以后才能测出来。

不过,核酸检测的操作流程比较复杂,需要专业人员进行采样,并送到专业机构进行检测,至少要4~6小时才能出诊断结果。

而抗原检测的操作流程相对简便,市民可以在家里自行检测,而且15分钟就能出结果。

(国家卫生健康委员会、《都市快报》)



『居民可购买试剂自测新冠病毒抗原』冲上热搜