

最新版新冠防控方案 这些地方有调整



《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》于6月28日正式公布。

根据国家第九版诊疗方案、防控方案以及大规模奥密克戎疫情应对处置方案等文件要求,我省第二版常态化防控方案、第六版应急预案出炉。最新的新冠防控方案做了哪些调整? (福建发布)

· 奥密克戎变异株 ·

目前已成为我国境外输入和本土疫情的优势流行株,现有研究提示,奥密克戎变异株平均潜伏期缩短,多为2~4天,传播能力更强,传播速度更快,感染剂量更低,致病力减弱,具有更强的免疫逃逸能力,现有疫苗对预防该变异株所致的重症和死亡仍有效。

我省第二版常态化防控方案主要包括指导思想、工作目标、工作措施及要求、保障措施等4个方面41条。

其中:

在健康管理措施方面

对入境人员、密接、次密接、高中低风险区旅居史人员健康管理措施按照第九版防控方案的要求相应进行调整。

● 将**密接、入境人员隔离管控的时间**从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”,核酸检测频次由原来的集中隔离第1、4、7、10、14天核酸检测,调整为集中隔离的第1、2、3、5、7天和居家健康监测的第3天进行核酸检测,解除隔离前不再要求双采双检。

● **次密接管控措施**从原来的7天集中隔离调整为7天居家隔离,核酸监测的时间为第1、4、7天。

● 对**7天内有高风险区旅居史人员**,采取7天的集中隔离措施。

● 对**近7天内有中风险区旅居史人员**,采取7天居家隔离措施。

● 对**有高中风险区所在县(市、区、旗)其他低风险区7天旅居史的入(返)闽人员**,实施“3天2检”,结果为阴性者,不限制活动。

调整高风险岗位从业人员解除闭环管理后的防控措施。

● 高风险人员解除闭环管理后,从原来的“7天集中隔离+7天居家健康监测”调整为7天集中隔离或居家隔离。

● 对来自陆路边境口岸城市的人员,要求持48小时核酸阴性证明即可。



在重点人群常态化核酸检测方面

● 按照国家确定的20类人群,明确不同情景和不同场景下核酸筛查的策略。

● **对与入境人员、物品、环境直接接触的人员**,比如口岸一线、集中隔离点、定点医疗机构等,从每周一次的核酸检测**调整为每天一次的核酸检测。**

● **对人员密集、接触人员频繁、流动性强的从业人员**,比如说快递、运输、商贸市场和超市等,**调整为每周2次核酸检测。**

● 明确了重点机构、场所、人员的核酸要求。

● 同时,结合泉州、宁德等疫情处置经验做法,对检测人群进一步细化。



在分区分级精准管控方面

统一使用高中低风险区的概念,划分的范围以居民小区或者村屯为单位。

划分标准简单地讲就是:

● 将病例和无症状感染者居住地,以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域,划为**高风险区**。

● 将病例和无症状感染者停留和活动一定时间,且可能具有疫情传播风险的工作地和活动地等区域,划为**中风险区**。

● 中高风险区所在县(市、区)的其他地区为**低风险区**。

● **经研判无社区传播风险,可不划定风险区。**

上述区域范围内,分别实施相应管理措施。



● 高风险区实施“**足不出户、上门服务**”等封控措施。

● 中风险区实施“**人不外出、错峰取物**”等管控措施。

● 低风险区实施“**个人防护、避免聚集**”等防范措施。

高风险区连续7天无新增阳性感染者可降为中风险区,如果这个中风险区又有3天无新增阳性感染者可降为低风险区。但是原来是中风险区要降为低风险区,时限仍为7天。所在县(市、区)无中高风险区,低风险区调整为常态化防控。

《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》近日发布以来,疫情监测、风险人员的隔离管理、中高风险区划定标准等有所调整,进一步提高疫情防控的科学性、精准性。

为何修订防控方案?

国家卫生健康委疾控局传染病防控处处长刘清表示,修订防控方案有三个方面考虑:

一是疫情形势的变化。新冠肺炎疫情仍然在世界范围内持续流行,今年以来全国本土疫情发生频次明显增多,疫情波及地区范围较广,我国外防输入、内防反弹的压力不断加大,防控形势更加严峻复杂。

二是病毒变异的特点。作为优势流行株,奥密克戎的潜伏期缩短,传播能力和隐匿性更强,传播速度更快,给疫情防控带来新的挑战。

三是前期试点工作结果和疫情防控实践。国务院联防联控机制综合组今年4月至5月在大连、苏州、宁波、厦门、青岛、广州和成都等7个人境城市开展了为期4周的疫情防控措施优化试点工作。同时充分吸收借鉴了各地防控工作实践和疫情处置经验。

“第九版防控方案是对防控措施优化,绝不是放松防控。”刘清表示,关键是要把该管住的重点管住、该落实的落实到位、该取消的坚决取消,进一步提高疫情防控的科学性、精准性。

为何调整风险人员隔离期限?

4月至5月开展的疫情防控措施优化试点研究发现,奥密克戎变异株平均潜伏期缩短,多为2天至4天;绝大部分都能在7天内检出。

“为进一步提高新冠肺炎疫情防控措施的科学性、精准性,基于研究结果和国内多地的防控实践,第九版防控方案对疫情相关风险人员的隔离管控时限和方式进行了优化。”中国疾控中心传染病管理处研究员王丽萍说。

将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离+3天居家健康监测”,密接的密接管控措施从“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”……

“这样的调整,是根据奥密克戎变异株的流行特点对防控措施进一步优化,不会增加疫情传播的风险,是精准防控的体现。”王丽萍说。(新华社)

为何调整风险人员隔离期限?