

为何不再判定密接的密接 取消中风险区判定

11月12日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍优化调整新冠疫情防控措施。

国家卫健委新闻发言人米锋介绍,二十条优化措施是对第九版防控方案的完善,不是放松防控,更不是放开、“躺平”,而是为了进一步提升防控的科学性、精准性,是为了最大程度保护人民生命安全和身体健康,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

发布会上国家疾控局副局长常继乐对大家特别关注的几条措施,做了详细解释。

为什么密切接触者管控措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”?

随着病毒变异,其潜伏期逐渐缩短,在5天内发现阳性的概率很高。

我国是人口众多的发展中国家,集中隔离时间由7天改成5天预计可节省大量隔离资源(约30%)。

考虑到奥密克戎最长潜伏期为8天,5天集中隔离结束后实施3天居家隔离能最大限度管控住风险。

为什么不再判定密接的密接?

评估显示,密接的密接人群规模大,但感染风险极低,阳性检出率仅为3.1/10

万。通过及时判定并管控密切接触者,就能降低密接的密接转阳的风险。因为极低的阳性概率造成大量人员被管控,两害相权取其轻,故不再判定密接的密接。

为什么取消中风险区判定?

评估显示,中风险区阳性检出率低,仅为3/10万。但中风险区划定后,导致大量人员被管控,出行和流动受到限制,同时消耗了大量基层工作人力。因此取消中风险区判定。

为什么高风险区外溢人员管控措施调整为“7天居家隔离”?

评估显示,高风险区外溢人员阳性检出率为4.9/10万,均在风险区域划定后7天内检出。高风险区阳性人员外溢主要与风险区划定不及时、范围不准确、协查不及时有关,发生疫情的地方要第一时间精准划定高风险区并对社会公布。

为什么对结束闭环作业的高风险岗位从业人员管控措施调整为“5天居家健康监测”?

评估显示,解除闭环管理的高风险岗位从业人员感染风险极低,阳性检出率为1.6/10万。通过闭环和居家健康监测期间规范开展核酸检测,可以及时发现感染者。

国家卫健委:优化调整能够明显缓解各地疫情处置中的一些瓶颈和障碍。

国家卫健委副主任雷海潮表示,不断优化疫情的防控举措,不是放松疫情防控工作,而是强调更加科学精准,强调更加与时俱进,要根据病毒的演进变化趋势,还有实际防控能力的改善和提升,以及积累的临床治疗的经验和认识,来优化和调整疫情防控措施。总的要求就是,要落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,做到既防住疫情,又尽可能减少对经济社会发展 and 民生服务保障的影响。

结合对第九版防控方案等政策实施情况的评估结果,经过专家的深入研究和论证,提出了二十条优化完善的政策举措,优化之后的举措能够

明显缓解各地疫情处置当中遇到的一些瓶颈和障碍的问题,比如说隔离资源相对比较紧张,隔离房间不足。

另外,流调方面压力非常大,流调的人员也相对不足。比如说,这次取消了对于密接的密接的判定,这在一定程度上可以更好地集中流行病学调查人员的精力和时间,来把风险地区和密接人员的有关调查和风险管控的工作做得更好,能够用更小的代价在尽可能短的时间把疫情控制在最小的范围,平衡好疫情防控和经济社会发展之间的关系。

所以这样的调整和优化,是要更加精准科学地做好疫情防控和处置工作。

(央视新闻 健康中国 人民日报微博)

什么是“社会面清零”

近期,大家都很关注“社会面清零”这个话题。
“社会面清零”到底是什么意思?如何实现这个目标?社会面清零是否等同于解封?

什么是社会面清零?

“社会面清零”是指当前社区传播基本阻断,之后发现的所有新增感染者都已经在隔离管控区当中,也就是说,除集中隔离人员、居家隔离人员、高风险区居民、闭环管理重点人群之外的人员中没有新增新冠感染者。



社会面清零说明已经初步阻断了新冠肺炎的社区传播,是逐步解封的一个前提条件。



如何实现社会面清零?



要尽快实现社会面清零,必须做到“应检尽检”,让感染者及时被发现,第一时间隔离;



高风险区外的感染者通过核酸检测被发现并及时转运至定点医院;



还要“应隔尽隔”:所有密接、次密接排查管控到位;



精准划定中高风险区,进行严格管控。

实现社会面清零不等于解封

实现社会面清零后,不代表彻底解封,居民仍需加强防范,主动、自觉地落实核酸检测、抗原自测、健康监测等措施,防止疫情出现反弹。



即便解封,也要做到“解封不解防”,保证和巩固疫情防控成果。

--- 防疫工作还需从以下几点发力: ---

1

要加强重点场所、重点机构、重点人群的疫情防控工作。



社会面清零后,各地在根据疫情形势逐步有序地恢复生产生活秩序后,仍要按照第九版防控方案中《重点场所、重点机构和重点人群新冠肺炎疫情防控技术指南》的要求,落实好对出入人员的测温、扫码、查验核酸检测阴性证明等防控措施。



2

要重点关注管控区的疫情防控工作。



对集中隔离、定点医疗机构以及中高风险区域的人群,按照第九版防控方案,落实隔离期间以及解除隔离后的相关要求。

3

要加强监测预警。

充分发挥各级医疗机构哨点作用,对发热、新入院、陪护人员严格执行新冠病毒核酸检测;



加强各类药店监测预警作用,对“一退两抗”等药物购买人员严格实行实名登记制度。

4

广大市民朋友仍需加强防范,主动、自觉地落实核酸检测、健康监测等要求,防止疫情反弹。

