

双胞胎腹中“宫斗” 凶险

□本报记者 廖小勇
通讯员 陈 锋

27岁的许女士,几个月前产检得知怀了双胞胎。然而,孕19周时,她发现肚子增大速度快、腹胀明显,便到厦门市妇幼保健院产前诊断科就诊。超声显示,许女士所怀的一个胎儿(受血儿)羊水最大深度8cm,而另一个胎儿(供血儿)羊水最大深度只有1.6cm,经诊断,许女士确诊双胎特有的并发症——双胎输血综合征Ⅱ期。

有人形象地将“双胎输血综合征”比喻成在子宫内上演的“宫斗剧”:为了获得更好的营养和血供,两者都在争夺。

这种宫斗剧往往都是杀敌一千、自损八百。如果不及时发现和适时干预,孕期未经治疗的TTTS围产儿病死率

高达90%,情况万分危急!

病情危急。产科吴琦嫦主任决定为她实施胎儿镜下胎盘交通血管激光凝闭术。术中,她寻找并确定胎盘表

面的血管吻合点,小心翼翼地避开胎儿的肢体,成功电凝了胎盘表面血管交通支10支,大大改善了双胞胎互相输血的情况。

术后复查,彩超提示供血胎儿的羊水恢复正常;由于病情的特殊性和凶险性,受血儿宫内胎停育。

孕21+4周时,吴主任及时为她实施了受血胎儿羊水减量术,再次保障了母婴安全。直到许女士37+1周足月后,顺利剖宫产一健康女婴,母女平安。



双胎输血综合征(TTTS)

TTTS是单绒毛膜双胎的复杂并发症之一。

当双胎之间血流压力不平衡时,出现一胎向另一胎输血,致使受血儿羊水过多、心功能衰竭,供血儿羊水过少、生长受限及贫血等,严重的会造成胎死宫内,并且过多的羊水会增加母亲的心肺负担,出现妊娠并发症的几率很高。

□本报记者 陈 坤
通讯员 陈文璇

几个月之前,林先生突然开始咳嗽。直到去年12月份,第一波新冠病毒感染高峰来了,林先生阳康后,持续的咳嗽不见好,变得更严重。

“当时,我还觉得是阳康后遗症。”林先生找到福州市第一医院呼吸与危重症医学科徐礼裕主任。徐礼裕当即判断,林先生咳嗽大半年的症状极有可能是肺部异物导致的。CT检查发现,林先生肺部左主支气管开口处有一个高密度影。

原来,半年前的一天,林先生的爱人在家里煮了海鲜粉干,食材丰富,有虾、花蛤、蛭、鱿鱼等。下班后的林先生饥肠辘辘,三口并做两口吃了一大碗。

吃的过程中,他感觉有个硬壳一样的东

西,和粉条一起滑进了食管里。怕是海鲜的壳,他马上跑到厕所,用手使劲抠了几下,将一部分吃进去的食物吐了出来。

吐完后,林先生感觉异物感没那么强烈,以为壳已完全吐出,从此便没在意。没想到,这个硬壳已经“跑”到他的支气管里。

“我们马上给他做了气管镜,异物已经被肉芽包裹,且一夹就碎。”在内镜下,徐礼裕看到,林先生的左边主支气管几乎被肉芽堵死了,且已经化脓,才导致了他出现阻塞性肺炎、持续咳嗽的症状。

经过四次艰难高分险手术,气管重新恢复通畅。

“如果异物没被顺利取出,患者可能半边肺要切除。”徐礼裕介绍。

咳嗽半年险些切肺 竟因一碗粉干

公益广告

福建卫生报

倡导全民健康生活方式

科学食养 管好血压

